

～副作用確認シート～

ID: _____

月/日: _____ コース: _____ 体重: _____ 体温: _____ 血圧: _____ 脈拍数: _____ SpO2: _____

重症筋無力症・筋炎

- まぶたが下がってくる
- 物が二重に見える
- 筋肉痛がある

I型糖尿病

- 喉がひどく渇く
- 水を多く飲む
- 尿量が増える

間質性肺炎

- 息苦しい
- 咳が増えた
- 37.5度以上の発熱

大腸炎・下痢

- 下痢
- 便に血が混じる



内分泌障害

- 体がだるい
- 食欲が落ちる
- 吐き気

静脈血栓塞栓症

- むくみや腫れがある

皮膚障害

- 発疹がある
- 皮膚に痒みがある

神経障害

- 手足のしびれがある
- 力の入りにくさを感じる

間質性肺炎の症状がある場合、速やかに病院へご連絡ください。

症状 \ グレード	0	1	2	3
対処		症状が2, 3日続く場合、速やかに病院へ連絡しましょう。		速やかに病院に連絡しましょう。
呼吸困難 (息苦しい)	ない	階段や坂道を登る際に息切れがある	ゆっくり歩行した際に息切れはあるが、日常生活はできる	息切れのため、身の回りのこともできない
倦怠感 (体のだるさ)	ない	動くのだるいが休むと回復する	いつもだるさはあるが、日常生活はできる	だるさのため日常生活のこともできない
食欲不振	ない	食欲低下を感じるが、食量量は変わらない	食欲低下を感じ、食量量が減った	経腸静脈栄養を要する
嘔吐	ない	1日に1-2回吐く	1日に3-5回吐く	1日に6回以上吐く
下痢	ない	普段と比べ1日1~3回下痢が増えた	普段と比べ1日4-6回下痢が増えた	普段と比べ1日に7回以上下痢が増えた
手足のしびれ (部位:)	ない	手足に違和感がある	しびれを感じるが、日常生活はできる	しびれのため、身の回りのこともできない
筋力低下 (力が入りにくい) (部位:)	ない	明らかな筋力低下はないが、力の入りにくさを感じる	明らかな筋力低下はあるが、日常生活はできる	明らかな筋力低下のため、身の回りのこともできない
その他症状				