

# 免疫チェックポイント阻害薬による治療を受ける患者さんへ

免疫チェックポイント阻害薬の副作用を予防する方法はみつかっておらず、出現時期も個人によって異なります。副作用の中には、症状が急速に悪化し、生命に関わる場合もあります。副作用について正しく理解し、対処しましょう。

氏名： \_\_\_\_\_

## ● 日常生活での注意点について正しければ☑を入れて下さい

- 自宅で過ごしているときも副作用症状が出ることもある
- 他の診療科や病院を受診するときは、免疫チェックポイント阻害薬で治療していることを医師に知らせる
- ワクチンを接種する前に医師に相談する

## ● すぐに病院に連絡が必要な症状

☑を入れて下さい

## ● 次回受診時に報告が必要な症状

☐を入れて下さい

### 重症筋無力症・筋炎

まぶたが下がってくる  
物が二重に見える  
筋肉痛がある

### 心筋炎

息苦しい  
むくみ、体重増加がある  
動悸がする

### 1型糖尿病

喉がひどく渇く  
水を多く飲む  
尿量が増える

### 間質性肺炎

息苦しい  
咳が増えた  
37.5℃以上の発熱

### 大腸炎・下痢

下痢  
便に血が混じる

### 内分泌障害

体がだるい  
食欲が落ちる  
吐き気

### 静脈血栓塞栓症


むくみや腫れがある

### 皮膚障害

発疹がある  
皮膚に痒みがある

### 神経障害

手足のしびれがある  
力の入りにくさを感じる



※ここに記載されている以外の症状も出現することがあります。