

# ～ ICI 副作用確認シート ～

患者名: \_\_\_\_\_

月/日: \_\_\_\_\_

使用ICI名: \_\_\_\_\_

投与中 / 治療経験あり

## すぐに病院に連絡が必要な症状

重症筋無力症・筋炎

- まぶたが下がってくる
- 物が二重に見える
- 筋肉痛がある

心筋炎

- 息苦しい
- むくみや体重増加がある
- 動悸がする

1型糖尿病

- 喉がひどく渇く
- 水を多く飲む
- 尿量が増える

間質性肺炎

- 息苦しい
- 咳が増えた
- 37.5度以上の発熱

大腸炎・下痢

- 下痢
- 便に血が混じる



## 次回受診時に報告が必要な症状

内分泌障害

- 体がだるい
- 食欲が落ちる
- 吐き気

静脈血栓塞栓症

- むくみや腫れがある

皮膚障害

- 発疹がある
- 皮膚に痒みがある

神経障害

- 手足のしびれがある
- 力の入りにくさを感じる

※ここに記載されている以外の症状も出現することがあります

症状 \ グレード	0	1	2	3
呼吸困難	ない	階段や坂道を登る際に息切れがある	ゆっくり歩行した際に息切れはあるが、日常生活はできる	息切れのため、身の回りのこともできない
浮腫	ない	夕方にむくみがある	朝も改善しないむくみがある	急激なむくみと、それに伴う体重増加があり、身の回りのこともできない
倦怠感	ない	動くのだるいが休むと回復する	いつもだるさはあるが、日常生活はできる	だるさのため、日常生活ができない
食欲不振	ない	食欲低下を感じるが、食事は変わらない	食欲低下を感じ、食事が減った	経腸静脈栄養を要する
皮疹	ない	体表面積の10%未満	体表面積の10～30%未満	体表面積の30%以上
下痢	ない	普段と比べ1日1～3回下痢が増えた	普段と比べ1日4～6回下痢が増えた	普段と比べ1日に7回以上下痢が増えた
手足のしびれ (部位: )	ない	手足に違和感がある	しびれを感じるが、日常生活はできる	しびれのため、身の回りのこともできない
筋力低下 (部位: )	ない	明らかな筋力低下はないが、力の入りにくさを感じる	明らかな筋力低下はあるが、日常生活はできる	明らかな筋力低下のため、身の回りのこともできない
その他症状				